



سائل نترات الكالسيوم

م.م + بورون

منتج عضوي



التركيب (وزن/حجم %)

أكسيد الكالسيوم	29.0-27%
إجمالي النيتروجين	16-14%
نترات النيتروجين N-NO ₃	14%
نيتروجين الأمونيوم N-NO ₄	3.5-4.5%
البورون	1.0%

سائل نترات الكالسيوم 28% + بورون، هو كالسيوم سائل نقي وعالي التركيز يحتوي على 1% من الأمونيوم، وهو مثالي للحدائق بدون تربة. حلنا شفاف ومستقر، ونصح بالبدء في أوائل الربيع والاستمرار في نمو الفاكهة. تتعزز قوة جدران الخلايا بسبب ارتفاع نسبة الكالسيوم. تستفيد قدرة النبات على امتصاص الكالسيوم من وجود النيتروجين.

فوائد

تحليل حمض الهيوميك بطريقة قياس الألوان
A&L Western Agricultural Laboratories., Inc.
موديستو، كاليفورنيا، أغسطس 2020

- يحسن جودة الثمار (أقل عرضة للعفن المرارة ونهاية الزهر) والعمر الافتراضي.
- مطور للتطبيق الورقي والتسميد في البيوت البلاستيكية

التوافق

متوافق مع جميع الأسمدة باستثناء تلك المحتوية على كبريتات أو فوسفات. نتيجة لذلك، إما أن يكون الخزان منفصلاً، أو يجب استخدام الأسمدة على فترات زمنية مختلفة.

التعبئة والتغليف



خصائص المنتج

- عمليات إنتاج حاصلة على شهادة ISO 9001:2015 (قيد الانتظار...)
- يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم والكلوريد
- يحتوي على نسبة منخفضة من المعادن الثقيلة
- درجة حرارة التبلور منخفضة
- سهولة التعامل والتطبيق



bafagroTM

لتحقيق المردود الأقصى

SARL BAFAGRO INVEST

Lot 04, Section 09,
Group of Properties 248,
31038, Sidi Chahmi, ORAN, Algeria.

+213 662 431 005
info@bafagro.com
www.bafagro.com

سائل نترات الكالسيوم م.م

الجرعة | تطبيق على التربة / وورقي

هل كنت تعلم؟

لدينا أكبر تشكيلة من منتجات الكالسيوم لتلبية جميع احتياجاتك! في الحقول المفتوحة والمحاصيل الخالية من التربة ، نقدم حلول الكالسيوم للمعالجة شاملة والمعالجة الورقية والتسميد. لجميع حالات النمو ، توفر بافاغرو حلول الكالسيوم المناسبة.

المحاصيل	تاريخ التطبيق	الحد الأدنى ل / هـ	الحد الأقصى ل / هـ	معدلات الخلط الورقي / 100 لتر ماء
أشجار الفاكهة (التفاح والكمثرى) والخبوخ والنكتارين	4-6 تطبيقات: من الثمار بعد 14 يومًا • 6 تطبيقات عند حجم الجوز كل 14 يوم	4	6	
الفراولة	كل موسم النمو	4	6	
طماطم ، فلفل	يكرر التطبيق كل 7-10 أيام بعد 10 أيام من وضع الفاكهة	4	6	
الكروم	• في الخلط الدوري لمبيدات الآفات التي تبدأ بعد الزهر • من بداية تليين التوت فصاعدًا تتكرر كل 14 يومًا	4	6	150-200 مل
الأناناس	اضطراب القلب الأسود: يرش على فاكهة عمرها شهر واحد كل أسبوعين	4	6	
المانثو	تفكك داخلي ، قوام أكثر ثباتًا وإمكانية تخزين أفضل: قم بالرش بعد 30 و 60 و 90 يومًا من الإزهار	4	6	
الجوافة	تحسين جودة حياة الفاكهة التخزينية وإمكانية التخزين: رش 3 و 2 و 1 قبل الحصاد بأسبوع	4	6	
موز	في المرحلة الأولى من ملء الفاكهة ، كرر بعد 3 أسابيع	4	6	

قبل إنشاء خليط الرش في حالة التغذية الورقية عند دمجها مع كيميائيات حماية المحاصيل أو الأسمدة الأخرى ، يجب إكمال اختبار التوافق.

يتم توفير الجرعات المقترحة وخطوات التطبيق كإرشادات عامة. فقط بعد التشخيص الموضوعي يمكن تحديد الجرعات الدقيقة والتركيزات ومراحل التطبيق بسبب الظروف المحلية واستخدام الأسمدة الإضافية وعوامل أخرى.

عندما تلتقي الخبرة بالتغذية

بافاغرو إنفاست، هي شركة جزائرية رائدة في إنتاج الأسمدة والمضافات الحيوانية. نقدم لكم أكبر مجموعة من الأسمدة التي تجمع بين التغذية والتحفيز الحيوي. لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بمدير المبيعات الإقليمي المحلي في بافاغرو أو زيارة موقعنا على الويب:



bafagro™

لتحقيق المردود الأقصى

SARL BAFAGRO INVEST

Lot 04, Section 09,
Group of Properties 248,
31038, Sidi Chahmi, ORAN, Algeria.

+213 662 431 005
info@bafagro.com
www.bafagro.com